

**Concours commun Mines et Ponts 2023**  
**CORRIGÉ DE MATHÉMATIQUES 2 - PSI**

m.laamoum@gmail.com.

**Distance entre deux distributions de probabilités sur  $\mathbb{N}$ .**

**1. Nombre de points fixes d'une permutation**

1 ▷ On a  $\text{Card}(\mathcal{S}_n) = n!$  par suite  $d_n \leq n!$  et  $0 < \frac{d_n}{n!} \leq 1$  donc  $R_{\text{cv}} \left( \sum_{n \geq 0} \frac{d_n}{n!} x^n \right) \geq R_{\text{cv}} \left( \sum_{n \geq 0} x^n \right)$ , d'où  $R \geq 1$ .

2 ▷ • Soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  et  $\mathcal{P}_k$  l'ensemble de toutes les parties de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  ayant exactement  $k$  éléments, on a  $\text{Card}(\mathcal{P}_k) = \binom{n}{k}$ .

L'événement  $[X_n = k]$  est l'ensemble des permutations de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  ayant exactement  $k$  points fixes. Pour tout  $I \in \mathcal{P}_k$  notons  $F(I) = \{\sigma \in [X_n = k], \forall i \in I \sigma(i) = i\}$ , c'est l'ensemble des permutations de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  dont les points fixes sont exactement les éléments de  $I$ .

On a  $[X_n = k] = \bigcup_{I \in \mathcal{P}_k} F(I)$  et  $F(I) \cap F(J) = \emptyset$  si  $I \neq J$  donc

$$\text{Card}([X_n = k]) = \sum_{I \in \mathcal{P}_k} \text{Card}(F(I))$$

Si  $\sigma \in F(I)$  alors  $\sigma|_I = id_I$  et  $\sigma|_{\bar{I}}$  la restriction de  $\sigma$  à  $\bar{I}$ , le complémentaire de  $I$ , est un dérangement de  $\bar{I}$ , ainsi l'application  $\sigma \mapsto \sigma|_{\bar{I}}$  établit une bijection de  $F(I)$  sur l'ensemble des dérangements de  $\bar{I}$ , ce dernier est en bijection avec l'ensemble des dérangements de  $\llbracket 1, n - k \rrbracket$ , donc  $\text{Card}(F(I)) = d_{n-k}$  et

$$\text{Card}([X_n = k]) = \sum_{I \in \mathcal{P}_k} d_{n-k} = d_{n-k} \sum_{I \in \mathcal{P}_k} 1 = d_{n-k} \text{Card}(\mathcal{P}_k)$$

d'où

$$\text{Card}([X_n = k]) = \binom{n}{k} d_{n-k}.$$

•  $\mathbb{P}_n$  est la probabilité uniforme sur  $\mathcal{S}_n$  donc

$$\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{\text{Card}([X_n = k])}{\text{Card}(\mathcal{S}_n)} = \frac{1}{n!} \binom{n}{k} d_{n-k}.$$

ainsi

$$\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{d_{n-k}}{k!(n-k)!}$$

3 ▷ On a  $([X_n = k])_{0 \leq k \leq n}$  est un système complet d'événements (ils sont deux à deux disjoints et de réunion égale à  $\mathcal{S}_n$ ) donc  $\sum_{k=0}^n \mathbb{P}_n(X_n = k) = 1$  et

$$\sum_{k=0}^n \frac{d_{n-k}}{k!(n-k)!} = 1$$

Soit  $x \in ]-1, 1[$ , on a  $s(x)e^x = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n \right) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right)$  ( $R \geq 1$  donc  $s$  est définie sur  $]-1, 1[$  et exp est de rayon de convergence infini), le théorème du produit de Cauchy donne :  $s(x)e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n x^n$  avec

$$v_n = \sum_{k=0}^n \frac{d_{n-k}}{k!(n-k)!} = 1 \text{ d'où}$$

$$s(x)e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

On a  $R \geq 1$ , si on suppose que  $R > 1$  alors  $s$  est définie et continue en 1, mais la formule précédente donne

$$\lim_{x \rightarrow 1} s(x) = +\infty, \text{ ce qui est absurde, donc } R = 1.$$

4 ▷ Soit  $x \in ]-1, 1[$  on a

$$\begin{aligned} (1-x)s(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d_n}{n!} x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{d_n}{n!} - \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} \right) x^n \end{aligned}$$

Puisque  $(1-x)s(x) = e^{-x}$  alors  $(1-x)s(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$ , par unicité des coefficients d'un DSE on a

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} = \frac{(-1)^n}{n!} \quad \forall n \geq 1$$

une sommation de cette relation entre 1 et  $n$  donne  $\frac{d_n}{n!} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ , ainsi

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

5 ▷ Soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , d'après la question 2. on a  $\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{d_{n-k}}{k!(n-k)!}$  donc

$$\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{1}{k!(n-k)!} \left( (n-k)! \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{i!} \right)$$

d'où

$$\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{i!}.$$

6 ▷ Si  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et  $\sigma \in \mathcal{S}_n$ , on a  $U_i(\sigma) = 1$  si  $\sigma(i) = i$ , et  $U_i(\sigma) = 0$  sinon.

• On a  $U_i(\mathcal{S}_n) = \{0, 1\}$ , l'événement  $[U_i = 1] = \{\sigma \in \mathcal{S}_n, \sigma(i) = i\}$  est en bijection avec  $\mathcal{S}_{n-1}$  (par l'application qui à  $\sigma$  associe sa restriction à  $\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}$ ), donc  $\text{Card}([U_i = 1]) = (n-1)!$ .

Ainsi  $\mathbb{P}_n(U_i = 1) = \frac{\text{Card}([U_i = 1])}{\text{Card}(\mathcal{S}_n)} = \frac{1}{n}$  et  $\mathbb{P}_n(U_i = 0) = 1 - \mathbb{P}_n(U_i = 1) = 1 - \frac{1}{n}$ .

$U_i$  suit donc une loi de Bernoulli de paramètre  $\frac{1}{n}$ .

• On suppose ici  $n \geq 2$ . Soit  $i \neq j$ , on a  $U_i U_j(\mathcal{S}_n) = \{0, 1\}$  et

$$[U_i U_j = 1] = [U_i = 1] \cap [U_j = 1] = \{\sigma \in \mathcal{S}_n, \sigma(i) = i \text{ et } \sigma(j) = j\}$$

comme précédemment  $[U_i U_j = 1]$  est en bijection avec  $\mathcal{S}_{n-2}$  donc il est de cardinal  $(n-2)!$  ce qui donne

$$\mathbb{P}_n(U_i U_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)}$$

Donc  $U_i U_j$  suit une loi de Bernoulli de paramètre  $\frac{1}{n(n-1)}$ .

7 ▷ • Soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , si  $\sigma \in [X_n = k]$  alors il existe  $\{i_1, \dots, i_k\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $U_{i_1}(\sigma) = \dots = U_{i_k}(\sigma) = 1$  et  $U_j(\sigma) = 0$  si  $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$ , donc

$$X_n(\sigma) = U_{i_1}(\sigma) + \dots + U_{i_k}(\sigma) = \sum_{i=1}^n U_i(\sigma)$$

ainsi

$$X_n = \sum_{i=1}^n U_i$$

• Espérance : on a  $U_i \sim \mathcal{B}(\frac{1}{n})$  et  $\mathbb{E}(U_i) = \frac{1}{n}$  donc  $\mathbb{E}(X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(U_i) = 1$ .

Variance : on a  $\mathbb{V}(X_n) = \mathbb{E}(X_n^2) - \mathbb{E}(X_n)^2$  et  $X_n^2 = \sum_{i=1}^n U_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} U_i U_j$ , or  $U_i^2 = U_i$  pour tout  $i$ ,

donc  $X_n^2 = \sum_{i=1}^n U_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} U_i U_j$  et

$$\mathbb{E}(X_n^2) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(U_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(U_i U_j) = 1 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(U_i U_j).$$

de plus  $U_i U_j \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{n(n-1)}\right)$  pour tout  $i < j$ , donc  $\mathbb{E}(U_i U_j) = \frac{1}{n(n-1)}$  et

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(U_i U_j) &= \frac{1}{n(n-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 \\ &= \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=i+1}^n 1 \right) \\ &= \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (n-i) \\ &= \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} i \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ainsi  $\mathbb{E}(X_n^2) = 2$  et  $\mathbb{V}(X_n) = 1$ . Conclusion

$$\boxed{\mathbb{E}(X_n) = 1, \mathbb{V}(X_n) = 1}$$

8 ▷ Soit  $k$  un entier naturel, pour  $n \geq k$  on a  $\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{i!}$  donc

$$y_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{e^{-1}}{k!}.$$

par suite

$$\mathbb{P}(Y = k) = \frac{e^{-1}}{k!}.$$

et  $Y$  suit la loi de Poisson de paramètre 1.

9 ▷ • Soit  $t \in \mathbb{R}$ , on a  $G_{X_n}(t) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}_n(X_n = k) t^k$  et  $\mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{i!}$  donc

$$G_{X_n}(t) = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{k! i!} t^k \stackrel{(j=n-i)}{=} \sum_{k=0}^n \sum_{j=k}^n \frac{(-1)^{n-j}}{k! (n-j)!} t^k$$

remarquons que

$$\begin{cases} 0 \leq k \leq n \\ k \leq j \leq n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq j \leq n \\ 0 \leq k \leq j \end{cases}$$

donc

$$G_{X_n}(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^{n-j}}{(n-j)!} \left( \sum_{k=0}^j \frac{t^k}{k!} \right) \stackrel{(j=n-i)}{=} \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \left( \sum_{k=0}^{n-i} \frac{t^k}{k!} \right)$$

D'autre part  $Y \sim \mathcal{P}(1)$  donc

$$G_Y(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = k) t^k = e^{-1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} = e^{t-1}$$

- Soit  $t \in \mathbb{R}$ , on a

$$G_{X_n}(t) = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \right) - \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \left( \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \right).$$

le reste  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!}$  converge vers 0, quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , donc pour  $\varepsilon > 0$  il existe  $N$  tel que, si  $n \geq N$

alors  $\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \right| \leq \frac{\varepsilon}{e}$ , par suite

$$\left| \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \left( \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \right) \right| \leq \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \right| \leq \frac{\varepsilon}{e} \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \leq \varepsilon$$

donc  $\sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \left( \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} \right)$  converge vers 0, quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , ce qui donne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_{X_n}(t) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{i!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} = e^{t-1} = G_Y(t)$$

## 2. Convergence en variation totale

**10** ▷ Soient  $x, y, z$  trois distributions sur  $\mathbb{N}$ .

- Par inégalité triangulaire on a :  $|x(k) - y(k)| \leq x(k) + y(k)$  pour tout  $k$  dans  $\mathbb{N}$  donc

$$d_{VT}(x, y) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} y(k) = 1$$

ainsi  $0 \leq d_{VT}(x, y) \leq 1$ ;

- Séparabilité : on a

$$\begin{aligned} d_{VT}(x, y) &= 0 \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - y(k)| = 0 \\ &\Leftrightarrow |x(k) - y(k)| = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ &\Leftrightarrow x(k) = y(k), \forall k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

d'où  $d_{VT}(x, y) = 0 \iff x = y$ .

- Symétrie :  $d_{VT}(x, y) = \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - y(k)| = \sum_{k=0}^{+\infty} |y(k) - x(k)| = d_{VT}(y, x)$ .

- Inégalité triangulaire : on a

$$\begin{aligned} d_{VT}(x, z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - y(k) + y(k) - z(k)| \\ &\leq \sum_{k=0}^{+\infty} (|x(k) - y(k)| + |y(k) - z(k)|) \\ &\leq \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - y(k)| + \sum_{k=0}^{+\infty} |y(k) - z(k)| \end{aligned}$$

d'où  $d_{VT}(x, z) \leq d_{VT}(x, y) + d_{VT}(y, z)$ .

- 11** ▷ Soient  $X$  et  $Y$  deux variables de Bernoulli,  $X \sim \mathcal{B}(\lambda)$  et  $Y \sim \mathcal{B}(\mu)$  avec  $\lambda, \mu \in ]0, 1[$ .

On a

$$\begin{aligned} d_{VT}(p_X, p_Y) &= \frac{1}{2}|p_X(1) - p_X(1)| + \frac{1}{2}|p_X(0) - p_X(0)| \\ &= \frac{1}{2}|\mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(Y = 1)| + \frac{1}{2}|\mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(Y = 0)| \\ &= \frac{1}{2}|\lambda - \mu| + \frac{1}{2}|(1 - \lambda) - (1 - \mu)| \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{d_{VT}(p_X, p_Y) = |\lambda - \mu|}$$

- 12** ▷ • Soit  $X$  une variable de Bernoulli de paramètre  $\lambda \in ]0, 1[$ .

On a  $\pi_\lambda(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ ,  $p_X(1) = \lambda$ ,  $p_X(0) = 1 - \lambda$  et  $p_X(k) = 0$  pour  $k \geq 2$ , donc,

$$\begin{aligned} 2d_{VT}(p_X, \pi_\lambda) &= \sum_{k=0}^{+\infty} |p_X(k) - \pi_\lambda(k)| \\ &= |p_X(0) - \pi_\lambda(0)| + |p_X(1) - \pi_\lambda(1)| + \sum_{k=2}^{+\infty} \pi_\lambda(k) \\ &= |p_X(0) - \pi_\lambda(0)| + |p_X(1) - \pi_\lambda(1)| + 1 - \pi_\lambda(0) - \pi_\lambda(1) \\ &= |1 - \lambda - e^{-\lambda}| + |\lambda - \lambda e^{-\lambda}| + 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Soit  $\varphi : x \mapsto x + e^{-x} - 1$ , on a  $\varphi'(x) = 1 - e^{-x} \geq 0$  pour tout  $x \in ]0, 1[$ ,  $\varphi$  est croissante sur  $]0, 1[$  et  $\varphi(0) = 0$  donc  $\varphi(x) \geq 0$  sur  $]0, 1[$ .

Donc

$$2d_{VT}(p_X, \pi_\lambda) = \lambda + e^{-\lambda} - 1 + \lambda - \lambda e^{-\lambda} + 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda}$$

et

$$\boxed{d_{VT}(p_X, \pi_\lambda) = \lambda(1 - e^{-\lambda})}$$

- On a  $\varphi(\lambda) \geq 0$  donc  $1 - e^{-\lambda} \leq \lambda$  d'où  $\boxed{d_{VT}(p_X, \pi_\lambda) \leq \lambda^2}$ .

**13** ▷ On  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$   $p_{X_n}(k) = \mathbb{P}_n(X_n = k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{i!}$ ,  $p_{X_n}(k) = 0$  si  $k > n$  et  $\pi_1(k) = \frac{e^{-1}}{k!}$ , donc

$$\begin{aligned} 2d_{\text{VT}}(p_{X_n}, \pi_1) &= \sum_{k=0}^{+\infty} |p_{X_n}(k) - \pi_1(k)| \\ &= \sum_{k=0}^n |p_{X_n}(k) - \pi_1(k)| + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \pi_1(k) \\ &= \sum_{k=0}^n \left| \frac{e^{-1}}{k!} - \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{n-k} \frac{(-1)^i}{i!} \right| + e^{-1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}. \end{aligned}$$

sachant que  $e^{-1} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{i!}$  alors

$$2d_{\text{VT}}(p_{X_n}, \pi_1) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left| \sum_{i=n-k+1}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{i!} \right| + e^{-1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

**14** ▷ • Soit  $n$  un entier naturel, on a  $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+n+1)!}$ .

Ecrivons pour tout  $k \geq 0$ ,  $(k+n+1)! = (n+1)! \underbrace{(n+2)\dots(n+k+1)}_{k \text{ termes}}$  donc  $(k+n)! \geq (n+1)!(n+2)^k$ ,

ainsi

$$r_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)^k}$$

• On a  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+2)^k} = \frac{1}{1-\frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{n+1}$ , par suite

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq r_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1} \quad (*)$$

Ainsi

$$r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(n+1)!}$$

**15** ▷ De la question **13**. on a ,

$$\begin{aligned} 2d_{\text{VT}}(p_{X_n}, \pi_1) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left| \sum_{i=n-k+1}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{i!} \right| + e^{-1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \\ &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} r_{n-k} + e^{-1} r_n \end{aligned}$$

la relation (\*) donne  $0 \leq r_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1} \leq \frac{2}{(n+1)!}$  donc

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} r_{n-k} \leq 2 \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k+1)!} \leq 2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!(n-k+1)!}$$

on a

$$\sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!(n-k+1)!} = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$$

ce qui donne pour  $n$  assez grand

$$2d_{VT}(p_{X_n}, \pi_1) \leq \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{2e^{-1}}{(n+1)!} \leq \frac{2^{n+2}}{(n+1)!}$$

d'où

$$d_{VT}(p_{X_n}, \pi_1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{2^n}{(n+1)!}\right)$$

### 3. Autres estimations de distances en variation totale

16 ▷ Soit  $x$  et  $y$  sont deux distributions de probabilités sur  $\mathbb{N}$ ,  $x * y$  est définie de  $\mathbb{N}$  vers  $\mathbb{R}^+$ .

Les séries  $\sum x(n)$  et  $\sum y(n)$  convergent absolument, le théorème du produit de Cauchy donne : la série  $\sum v_n$ , avec  $v_n = \sum_{i+j=n} x(i)y(j)$ , converge absolument et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} v_n = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} y(n) = 1$$

comme  $v_n = (x * y)(n)$  alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} (x * y)(n) = 1$ .

Ainsi  $x * y$  est une distribution sur  $\mathbb{N}$ .

17 ▷ Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires sur  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ , indépendantes, à valeurs dans  $\mathbb{N}$ .

Pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ , on a  $p_{X+Y}(n) = \mathbb{P}(X + Y = n)$ . Soit  $\omega \in [X + Y = n]$  alors il existe  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  tel que  $X(\omega) = k$  et  $Y(\omega) = n - k$  donc

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k, Y = n - k)$$

et  $\mathbb{P}(X = k, Y = n - k) = \mathbb{P}([X = k] \cap [Y = n - k])$ , l'indépendance de  $X$  et  $Y$  donne

$\mathbb{P}(X = k, Y = n - k) = \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)$ , par suite

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k)$$

qui s'écrit

$$p_{X+Y}(n) = \sum_{k=0}^n p_X(k) p_Y(n - k) = p_X * p_Y(n)$$

d'où  $p_{X+Y} = p_X * p_Y$ .

On peut le faire en utilisant les fonctions génératrices et la relation  $G_{X+Y} = G_X G_Y$ , vérifiée par des variables indépendantes.

**18** ▷ Soient  $(x, y, u, v) \in (\mathcal{D}_{\mathbb{N}})^4$  et  $k$  entier naturel, on a

$$\begin{aligned} |(x * y)(k) - (u * v)(k)| &= \left| \sum_{i+j=k} (x(i) - u(i) + u(i)) y(j) - \sum_{i+j=k} u(i) v(j) \right| \\ &= \left| \sum_{i+j=k} (x(i) - u(i)) y(j) + \sum_{i+j=k} u(i) (y(j) - v(j)) \right| \\ &\leq \sum_{i+j=k} y(j) |x(i) - u(i)| + \sum_{i+j=k} u(i) |y(j) - v(j)|. \end{aligned}$$

**19** ▷ On a

$$\begin{aligned} d_{\text{VT}}(x * y, u * v) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} |(x * y)(k) - (u * v)(k)| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{i+j=k} y(j) |x(i) - u(i)| + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{i+j=k} u(i) |y(j) - v(j)| \end{aligned}$$

La formule du produit de Cauchy donne

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{i+j=k} y(j) |x(i) - u(i)| &= \left( \sum_{k=0}^{+\infty} y(k) \right) \left( \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - u(k)| \right) \\ &= \left( \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - u(k)| \right) \end{aligned}$$

par suite

$$\begin{aligned} d_{\text{VT}}(x * y, u * v) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} |(x * y)(k) - (u * v)(k)| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} |x(k) - u(k)| + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} |y(k) - v(k)| \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{d_{\text{VT}}(x * y, u * v) \leq d_{\text{VT}}(x, u) + d_{\text{VT}}(y, v)}$$

**20** ▷ Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\lambda \in ]0, 1[$ ,  $U \sim \mathcal{B}(n, \lambda)$  donc  $p_U(k) = \binom{n}{k} \lambda^k (1 - \lambda)^{n-k}$  si  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ .

Soit  $X_1, \dots, X_n$  des variables indépendantes qui suivent la loi de Bernoulli de paramètre  $\lambda$ , on sait que  $X_1 + \dots + X_n$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, \lambda)$  (c'est du cours) donc  $p_U = p_{X_1 + \dots + X_n}$ .

Soit  $Y_1, \dots, Y_n$  des variables indépendantes qui suivent la loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ , on sait que  $Y_1 + \dots + Y_n$  suit la loi binomiale  $\mathcal{P}(n\lambda)$  donc  $\pi_{n\lambda} = p_{Y_1 + \dots + Y_n}$ .

D'après la question 17.  $p_U = p_{X_1 + \dots + X_{n-1}} * p_{X_n}$  car  $X_1 + \dots + X_{n-1}$  et  $X_n$  sont indépendantes, de même  $\pi_{n\lambda} = p_{Y_1 + \dots + Y_{n-1}} * p_{Y_n} = p_{Y_1 + \dots + Y_{n-1}} * \pi_\lambda$ .

La question 19. donne

$$d_{\text{VT}}(p_U, \pi_{n\lambda}) \leq d_{\text{VT}}(p_{X_1 + \dots + X_{n-1}}, p_{Y_1 + \dots + Y_{n-1}}) + d_{\text{VT}}(p_{X_n}, \pi_\lambda)$$

D'après la question 12. on a  $d_{VT}(p_{X_n}, \pi_\lambda) \leq \lambda^2$ , donc

$$d_{VT}(p_U, \pi_{n\lambda}) \leq d_{VT}(p_{X_1+\dots+X_{n-1}}, p_{Y_1+\dots+Y_{n-1}}) + \lambda^2$$

ainsi par récurrence on obtient :

$$d_{VT}(p_U, \pi_{n\lambda}) \leq n\lambda^2$$

21 ▷ Soit  $\alpha > 0$ ,  $n > \lfloor \alpha \rfloor$  et  $B_n \sim \mathcal{B}(n, \frac{\alpha}{n})$ , on applique le résultat précédent avec  $\lambda = \frac{\alpha}{n} \in ]0, 1[$ .

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} |p_{B_n}(k) - \pi_\alpha(k)| = d_{VT}(p_{B_n}, \pi_\alpha) \leq \frac{\alpha^2}{n}$$

donc pour tout  $k$  dans  $\mathbb{N}$  on a  $|p_{B_n}(k) - \pi_\alpha(k)| \leq \frac{2\alpha^2}{n}$  ce qui donne  $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_{B_n}(k) = \pi_\alpha(k)$ .

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n = k) = e^{-\alpha} \frac{\alpha^k}{k!}$$

22 ▷ Soient  $\alpha > 0$ ,  $\beta > 0$ ,  $n > \max(\lfloor \alpha \rfloor, \lfloor \beta \rfloor)$ ,  $X_1, \dots, X_n$  des variables indépendantes qui suivent la loi de Bernoulli de paramètre  $\frac{\alpha}{n}$  et  $Y_1, \dots, Y_n$  des variables indépendantes qui suivent la loi de Bernoulli de paramètre  $\frac{\beta}{n}$ .

Posons  $B_n = X_1 + \dots + X_n$  et  $C_n = Y_1 + \dots + Y_n$ , on sait que  $B_n \sim \mathcal{B}(n, \frac{\alpha}{n})$  et  $C_n \sim \mathcal{B}(n, \frac{\beta}{n})$ .

On a

$$d_{VT}(\pi_\alpha, \pi_\beta) \leq d_{VT}(p_{B_n}, \pi_\alpha) + d_{VT}(p_{C_n}, \pi_\beta) + d_{VT}(p_{B_n}, p_{C_n})$$

d'après la question 20.  $d_{VT}(p_{B_n}, \pi_\alpha) \leq \frac{\alpha^2}{n}$  et  $d_{VT}(p_{C_n}, \pi_\beta) \leq \frac{\beta^2}{n}$ , avec la même méthode de la question 20. on a

$$d_{VT}(p_{B_n}, p_{C_n}) \leq d_{VT}(p_{X_1+\dots+X_{n-1}}, p_{Y_1+\dots+Y_{n-1}}) + d_{VT}(p_{X_n}, p_{Y_n})$$

d'après la question 11.  $d_{VT}(p_{X_n}, p_{Y_n}) = \left| \frac{\alpha}{n} - \frac{\beta}{n} \right|$ , donc

$$d_{VT}(p_U, \pi_{n\lambda}) \leq d_{VT}(p_{X_1+\dots+X_{n-1}}, p_{Y_1+\dots+Y_{n-1}}) + \left| \frac{\alpha}{n} - \frac{\beta}{n} \right|$$

par récurrence on obtient

$$d_{VT}(p_U, \pi_{n\lambda}) \leq n \left| \frac{\alpha}{n} - \frac{\beta}{n} \right| = |\beta - \alpha|$$

ainsi

$$d_{VT}(\pi_\alpha, \pi_\beta) \leq |\beta - \alpha| + \frac{\alpha^2}{n} + \frac{\beta^2}{n}$$

ceci est valable pour tout  $n > \max(\lfloor \alpha \rfloor, \lfloor \beta \rfloor)$ , par passage à la limite on a

$$d_{VT}(\pi_\alpha, \pi_\beta) \leq |\beta - \alpha|$$

FIN