

MATHEMATIQUES I

Concours d'Admission 1990

M P'

PREAMBULE

Dans tout le texte, z désigne une variable complexe ; l'exponentielle de z sera notée indifféremment e^z et $\exp z$, la partie réelle de z sera notée $\operatorname{Re}(z)$. On appellera Δ l'ensemble des nombres complexes de module strictement inférieur à 1. On conviendra de poser $0^0 = 1$.

On définit une application F de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ comme suit :

- $F(1) = 0$
- pour tout $z \neq 1$, $F(z) = \exp\left(-\frac{z}{1-z}\right)$

Le but du problème est d'établir que F est développable en série entière dans Δ et d'étudier quelques propriétés de la suite des coefficients de cette série entière.

La seconde et la troisième partie sont indépendantes.

PREMIERE PARTIE

On admettra le théorème (T) suivant :

Soit $(u_{n,k})_{n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}}$ une "suite double" à termes complexes, c'est-à-dire une application de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$, vérifiant les hypothèses suivantes :

(H1) • pour tout n , la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} |u_{n,k}|$ est convergente,

(H2) • la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} s_n$, où $s_n = \sum_{k=0}^{\infty} |u_{n,k}|$, est convergente.

Alors les deux membres de l'égalité ci-dessous ont un sens et sont égaux :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,k} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} u_{n,k} \right)$$

I.1. Soit n un entier naturel. Etablir que la fonction qui, à tout

$z \neq 1$, associe $\left(\frac{z}{1-z}\right)^n$ admet un développement en série entière dans Δ ,

développement que l'on notera $\left(\frac{z}{1-z}\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k} z^k$

Montrer que les $a_{n,k}$ sont des entiers naturels.

I.2. En utilisant le développement en série entière de $(1+x)^\gamma$, où γ est une constante réelle convenable et x une variable réelle comprise strictement entre -1 et 1, déterminer $a_{n,k}$ en fonction de n et de k .

I.3.a) Montrer que l'égalité $b_k = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{a_{n,k}}{n!}$

définit une suite $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de réels.

b) Calculer b_0, b_1, b_2 .

I.4. Etant donné z appartenant à Δ , établir que la "suite double" définie pour tout couple (n,k) d'entiers naturels par $u_{n,k} = (-1)^n \frac{a_{n,k}}{n!} z^k$ satisfait aux hypothèses du théorème (T).

I.5. Dédurre de ce qui précède que, pour tout z appartenant à Δ , l'on a :

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$$

On désignera par R le rayon de convergence de la série entière ci-dessus (on a évidemment $R \geq 1$).

DEUXIEME PARTIE

On se propose dans cette partie de déterminer R et de trouver une suite majorant la suite $|b_n|$.

On désigne par Δ' l'ensemble des z vérifiant $|z| \leq 1$ et $z \neq 1$. On confondra dans le langage les nombres complexes et les points du plan complexe les représentant.

II.1.a) Pour tout z complexe, on pose $z = x + iy$, x et y étant réels ; calculer $\mathcal{L}_n |F(z)|$ en fonction de x et y .

b) Etant donné un réel positif au sens large, on appelle C_λ l'ensemble des z vérifiant $|F(z)| = \lambda$. Déterminer une équation cartésienne de C_λ ; indiquer la nature et la position de C_λ .

Tourner la page

c) Tracer sur un même graphique les C_λ correspondant à $\lambda = \frac{1}{e}, 1, \sqrt{e}, e, e^2$.

II.2. Quelle est la borne supérieure de $|F(z)|$ lorsque z décrit Δ' ? Est-elle atteinte ? Si oui, en quels points ?

II.3.a) Montrer que F est continue en tout point autre que 1.

b) F est-elle continue au point 1 ?

c) La restriction de F à Δ a-t-elle une limite au point 1 ?

II.4. Déduire de II.3. la valeur de R (voir I.5).

La série $\sum |b_n|$ est-elle convergente ?

II.5.a) On donne r compris strictement entre 0 et 1. Etablir les formules valables pour tout n entier naturel :

$$b_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \left(\int_0^\pi F(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \right)$$

b) Etablir que l'intégrale $\int_0^\pi F(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$ est convergente.

c) Démontrer que l'on a $\lim_{r \rightarrow 1^-} \int_0^\pi F(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = \int_0^\pi F(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$

On pourra, ε étant choisi ($\varepsilon > 0$), partager $[0, \pi]$ en 2 intervalles : $[0, \varepsilon]$, $[\varepsilon, \pi]$.

II.6. En déduire la formule :

$$b_n = \frac{2\sqrt{e}}{\pi} \operatorname{Re} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \exp \left(2int + \frac{i}{2 \tan t} \right) dt \right)$$

II.7. Montrer que la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et donner une constante majorant $|b_n|$.

II.8. On pose, pour tout t compris strictement entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ et pour tout n entier strictement positif : $u_n(t) = 2nt + \frac{1}{2 \tan t}$

Etudier les variations et le signe des fonctions u_n, u'_n, u''_n . Expliciter en fonction de n la valeur T_n de l'unique zéro de u'_n .

II.9.a) Etablir, pour tout $n > 0$, l'existence et l'unicité d'un couple α_n, β_n de réels tels que : $0 < \alpha_n < T_n < \beta_n < \frac{\pi}{2}$

et $u'_n(\beta_n) = -u'_n(\alpha_n) = n^{3/4}$

b) Démontrer l'inégalité $u''_n(\beta_n) \geq 2n^{3/2}$

c) En déduire une majoration de $(\beta_n - \alpha_n)$.

II.10. Pour tout $n > 0$, on appelle respectivement I_n, J_n, K_n et L_n les intégrales de la fonction $t \rightarrow \exp(iu_n(t))$ sur les intervalles $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$[0, \alpha_n], [\alpha_n, \beta_n], \left[\beta_n, \frac{\pi}{2}\right]$

a) Donner une majoration de $|K_n|$.

b) En écrivant : $L_n = \int_{\beta_n}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{iu'_n(t)} \cdot e^{iu_n(t)} iu'_n(t) dt$

établir l'inégalité $|L_n| \leq \frac{2}{n^{3/4}}$

c) Majorer par la même technique $|J_n|$.

d) Déduire de ce qui précède une majoration de $|b_n|$ du type $C n^{-3/4}$ où C est une constante entière, qui soit valable pour tout n . On ne cherchera pas la meilleure valeur possible de C .

TROISIEME PARTIE

Cette partie est indépendante de la précédente. Elle a pour but essentiel une étude sommaire de la variation du signe de b_n en fonction de n .

III.1. Déterminer une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 vérifiée par $F(x)$ lorsque x décrit $] -1, 1[$.

III.2. On pose, dans toute la suite du problème, $C_n = n b_n$ pour tout n .

a) Etablir la relation de récurrence (R) :

Tourner la page.

$$C_{n+1} = \left(2 - \frac{1}{n}\right) C_n - C_{n-1} \quad \text{pour tout } n > 0$$

b) Déterminer C_n pour n allant de 0 à 6.

c) Montrer que s'il existe n non nul tel que $C_n = 0$, alors C_{n-1} et C_{n+1} sont non nuls et de signes opposés.

III.3. On pose, pour tout n entier strictement positif : $d_n = C_n - C_{n-1}$

Démontrer les formules :

$$C_{n+h} = C_n + d_{n+1} + d_{n+2} + \dots + d_{n+h} \quad (n \geq 0, h \geq 1)$$

$$d_{n+1} = d_n - \frac{C_n}{n} \quad (n \geq 1)$$

$$d_{n+h} = d_n - \left(\frac{C_n}{n} + \frac{C_{n+1}}{n+1} + \dots + \frac{C_{n+h-1}}{n+h-1} \right) \quad (n \geq 1, h \geq 1)$$

III.4. On suppose, dans cette seule question, qu'il existe n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$ on ait $C_n > 0$

Etablir que la suite $(d_n)_{n \geq n_0}$ est décroissante. Cette suite a donc une limite L finie ou non. En distinguant suivant les valeurs de L et en utilisant les relations établies dans la question précédente, aboutir à une contradiction.

III.5. On peut donc définir (on ne demande pas de le justifier) une suite $(\theta(n))_{n \geq 1}$ strictement croissante et à valeurs entières, possédant les propriétés suivantes :

$$\bullet \theta(1) = 0$$

$$\bullet (-1)^n C_{\theta(n)} \geq 0$$

$$\bullet \text{ Pour tout } k \text{ tel que } \theta(n) < k < \theta(n+1), \text{ l'on a } (-1)^n C_k > 0.$$

On note U_n l'intervalle $[\theta(n), \theta(n+1)[$ et $M_n = \max_{k \in U_n} |C_k|$

Dans la suite de cette question on suppose que n est pair.

a) Etablir les inégalités :

$$0 \leq C_{\theta(n)} < C_{\theta(n)+1}, \quad C_{\theta(n)+2} > C_{\theta(n)+1} > 0$$

En déduire une minoration de la longueur de U_n .

b) Etudier les variations de d_p lorsque p varie de $\theta(n)$ à $\theta(n+1)$.

c) En déduire les variations de C_p quand p décrit U_n .

d) En utilisant III.5.a, établir que si p, q, r appartiennent à U_n et vérifient $p < q < r$, on a alors : $\frac{C_q - C_p}{q - p} > \frac{C_r - C_q}{r - q}$

Faire une figure représentant l'ensemble des points de coordonnées (k, C_k) , k décrivant U_n ; interpréter géométriquement l'inégalité précédente.

e) Indiquer très sommairement ce que deviennent les résultats ci-dessus pour n impair.

III.6.a) Soit n un entier pair et h un entier vérifiant $0 \leq h < \theta(n+1) - \theta(n)$.

Etablir la relation $C_{\theta(n)+h} \leq (h+1) d_{\theta(n)}$.

$$b) \text{ En déduire } d_{\theta(n)+h} \geq d_{\theta(n)} \left(1 - \frac{h(h+1)}{2\theta(n)} \right)$$

c) Soit ω_n le plus petit entier k de U_n tel que $C_k = M_n$.

Donner une minoration de $\omega_n - \theta(n)$ ne faisant intervenir que $\theta(n)$.

d) Montrer que la minoration obtenue est valable aussi pour n impair.

Quelle est la limite de $\theta(n+1) - \theta(n)$ quand n tend vers $+\infty$?

(P' :
III.6.)

III.7. On cherche à préciser numériquement $\theta(n)$. Soit N un entier donné.

Décrire (en français) un algorithme permettant de calculer les valeurs de $\theta(n)$ pour n variant de 1 à N .

Déterminer ces valeurs pour $N = 10$.

*** FIN ***