

**ÉPREUVE de MATHÉMATIQUES 2**  
**CCP    PSI    2009**

---

**Partie I.**

**I.1.1.** On a  $x_1 = \sin(\theta)$ ,  $x_2 = 2x_1 \cos(\theta) = \sin(2\theta)$ , on peut donc conjecturer la propriété  $(\mathcal{R}_p) : x_p = \sin(p\theta)$  pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ , et on le prouve par récurrence "double" :

- les assertions  $(\mathcal{R}_1)$  et  $(\mathcal{R}_2)$  sont vraies, cf. ci-dessus ;
- soit  $p \in \mathbb{N}^*$ , supposons  $(\mathcal{R}_p)$  et  $(\mathcal{R}_{p+1})$ , c'est-à-dire  $x_p = \sin(p\theta)$  et  $x_{p+1} = \sin((p+1)\theta)$ , on a alors

$$\begin{aligned} x_{p+2} &= -x_p + 2x_{p+1} \cos(\theta) = -\sin(p\theta) + 2 \sin((p+1)\theta) \cos(\theta) \\ &= -\sin(p\theta) + \left[ \sin((p+2)\theta) + \sin(p\theta) \right] = \sin((p+2)\theta), \end{aligned}$$

et l'assertion  $(\mathcal{R}_{p+2})$  est vérifiée, ce qui achève la récurrence.

**I.1.2.** On a  $x_{n+1} = 0 \iff \sin((n+1)\theta) = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1} \quad (k \in \mathbf{Z})$ .

**I.2.1.** On a  $A_n(t) = \begin{pmatrix} 2t & 1 & & & (0) \\ 1 & 2t & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & & 1 & 2t \end{pmatrix}$ , matrice tridiagonale symétrique.

On calcule  $d_1(t) = 2t$ ,  $d_2(t) = 4t^2 - 1$ ,  $d_3(t) = 8t^3 - 4t$ ,  $d_4(t) = 16t^4 - 12t^2 + 1$ .

**I.2.2.** Un développement par rapport à la première colonne, puis un développement par rapport à la première ligne dans le deuxième terme obtenu conduisent à la relation  $d_n(t) = 2t d_{n-1}(t) + d_{n-2}(t)$  pour tout  $n \geq 3$ . On montre alors par une récurrence double que, pour tout  $n$  entier naturel non nul, la fonction  $d_n$  est polynomiale de degré  $n$ , et de coefficient dominant  $2^n$ .

**I.3.1.** Démonstration par récurrence "double" sur  $n$ . La propriété est vraie pour  $n = 1$  et  $n = 2$  : en effet,  $d_1(\cos \theta) = 2 \cos \theta = \frac{\sin 2\theta}{\sin \theta}$  et  $d_2(\cos \theta) = 4 \cos^2 \theta - 1 = \frac{\sin 3\theta}{\sin \theta}$  par un petit calcul trigonométrique facile laissé à l'improbable lecteur. Si elle est vraie aux rangs  $n$  et  $n+1$  avec  $n \geq 1$ , alors

$$\begin{aligned} d_{n+2}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta \cdot d_{n+1}(\cos \theta) - d_n(\cos \theta) \\ &= \frac{2 \cos \theta \cdot \sin(n+2)\theta - \sin(n+1)\theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin(n+3)\theta}{\sin \theta} \end{aligned}$$

(c'est le même calcul qu'à la question **I.1.** à un décalage d'indice près). Voilà!

**I.3.2.** On a donc  $d_n(\cos \theta) = 0 \iff \sin((n+1)\theta) = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ , avec  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  puisque  $\theta \in ]0, \pi[$ .

**I.4.1.**  $A_n(0) - \lambda I_n = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & & & (0) \\ 1 & -\lambda & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & & 1 & -\lambda \end{pmatrix} = A_n\left(-\frac{\lambda}{2}\right)$ , donc  $\chi_n(\lambda) = d_n\left(-\frac{\lambda}{2}\right)$ .

**I.4.2.** Pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , posons  $\lambda_k = -2 \cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) = 2 \cos\left(\frac{(n+1-k)\pi}{n+1}\right)$ , on a alors  $\chi_n(\lambda_k) = d_n\left(\cos\frac{k\pi}{n+1}\right) = 0$  d'après les questions **I.3.2.** et **I.4.1.** ci-dessus. Les réels  $\lambda_k$ ,

$1 \leq k \leq n$  sont donc valeurs propres de la matrice  $A_n(0)$ . Mais ces réels sont deux à deux distincts (car la fonction  $-\cos$  est strictement croissante sur  $[0, \pi]$ , donc  $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$ ), donc on a obtenu ainsi toutes les valeurs propres de la matrice  $A_n(0)$  qui est d'ordre  $n$ . Ainsi,  $\text{Sp}(A_n(0)) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ . On peut en déduire au passage que la matrice  $A_n(0)$  est diagonalisable sur  $\mathbb{R}$  et que ses sous-espaces propres sont de dimension un. Sa plus grande valeur propre est  $\rho = \lambda_n = -2 \cos\left(\frac{n\pi}{n+1}\right) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right)$ .

**I.4.3.** Posons  $\theta = \frac{\pi}{n+1}$ . Le vecteur  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ \sin 2\theta \\ \vdots \\ \sin n\theta \end{pmatrix}$  est non nul et vérifie, d'après la

question **I.1.**, la relation

$$(A_n(0) - \rho I_n) X = \begin{pmatrix} -2 \cos \theta & 1 & & & (0) \\ 1 & -2 \cos \theta & 1 & & \\ & & 1 & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & & & 1 & -2 \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -x_{n+1} \end{pmatrix} = 0$$

puisque  $x_{n+1} = \sin \frac{(n+1)\pi}{n+1} = 0$ . Ce vecteur  $X$  est donc vecteur propre de la matrice  $A_n(0)$  associé à la valeur propre  $\rho = 2 \cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right)$ , et ses coordonnées sont strictement positives puisque la fonction sinus est strictement positive sur  $]0, \pi[$ .

## Partie II.

**II.1.1.** Si  $\varphi$  est un automorphisme orthogonal de  $\mathbb{R}^n$ , on a  $\|\varphi(x)\| = \|x\|$  pour tout  $x$ , d'où évidemment  $\|\varphi\| = 1$ .

**II.1.2.** Soit  $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $|\alpha_{i_0}| = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |\alpha_i|$ . Soit  $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in \mathbb{R}^n$ ; alors

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2, \text{ puis } \delta(x) = \alpha_1 x_1 e_1 + \dots + \alpha_n x_n e_n \text{ et } \|\delta(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 x_i^2 \leq \alpha_{i_0}^2 \|x\|^2, \text{ on}$$

a donc  $\|\delta\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\delta(x)\|}{\|x\|} \leq |\alpha_{i_0}|$ . Enfin,  $\|e_{i_0}\| = 1$  et  $\delta(e_{i_0}) = \alpha_{i_0} e_{i_0}$ , donc  $\|\delta(e_{i_0})\| = |\alpha_{i_0}|$ ,

ce qui prouve que  $\|\delta\| = \sup_{\|u\| \leq 1} \|\delta(u)\| = |\alpha_{i_0}| = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |\alpha_i|$ .

**II.1.3.** Si  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  est autoadjoint, il existe une base orthonormale  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $\mathbb{R}^n$  dans laquelle  $f$  est représenté par une matrice diagonale  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , où les  $\lambda_i$  sont les valeurs propres de  $f$ . D'après **II.1.2.** ci-dessus, on a alors  $\|f\| = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |\lambda_i| = \max_{\lambda \in \text{Sp}(f)} |\lambda|$ .

**II.2.1.** On sait (théorème du cours) que toute application bilinéaire en dimension finie est continue. L'application  $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $B(u, v) = (l(u)|v)$  est donc pour cette raison continue. De plus, l'application  $\Delta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  définie par  $\Delta(u) = (u, u)$  est continue car elle est linéaire en dimension finie. Donc l'application  $\Phi = B \circ \Delta$  est continue sur  $\mathbb{R}^n$  comme composée de fonctions continues. *Remarque :* l'application  $\Phi$  est

la forme quadratique associée à la forme bilinéaire symétrique  $B$ , et on peut dire aussi que  $l$  est l'endomorphisme autoadjoint associé à la forme bilinéaire symétrique  $B$  dans l'espace euclidien  $\mathbb{R}^n$  muni du produit scalaire canonique.

La sphère unité  $S$  de  $\mathbb{R}^n$  est compacte, car c'est un fermé borné en dimension finie ( $S$  est fermé car c'est l'image réciproque de la partie fermée  $\{1\}$  de  $\mathbb{R}$  par l'application norme  $N : x \mapsto \|x\|$  qui est continue sur  $\mathbb{R}^n$  car elle est 1-lipschitzienne). L'application  $\Phi$ , continue sur le compact  $S$ , y atteint donc un maximum.

**II.2.2.** Comme  $\|u\| = \|v\| = 1$  et  $(u|v) = 0$ , on a

$$\|w\|^2 = \frac{1}{\alpha^2} (\|v\|^2 + t^2\|u\|^2) = \frac{1+t^2}{\alpha^2}$$

et  $w \in S \iff \alpha^2 = 1+t^2$ .

On a alors  $\Phi(w) \leq \Phi(v)$ , soit  $\Phi\left(\frac{v+tu}{\sqrt{1+t^2}}\right) \leq \Phi(v)$ , et ceci pour tout réel  $t$ , donc

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \frac{1}{1+t^2} (l(v+tu)|v+tu) \leq (l(v)|v).$$

En développant et en tenant compte du caractère autoadjoint de  $l$ , on obtient, après simplifications :

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \left(\Phi(v) - \Phi(u)\right) t^2 - 2(l(v)|u) t \geq 0. \quad (*)$$

On peut conclure en considérant deux cas :

- si  $\Phi(u) = \Phi(v)$ , on a  $\forall t \in \mathbb{R} \quad (l(v)|u) t \leq 0$ , ce qui entraîne  $(l(v)|u) = 0$  ;
- si  $\Phi(u) < \Phi(v)$ , le premier membre de (\*) est un trinôme toujours positif, donc son discriminant est négatif ou nul, soit  $(l(v)|u)^2 \leq 0$ , donc  $(l(v)|u) = 0$ .

On vient de prouver que le vecteur  $l(v)$  est orthogonal à tout vecteur orthogonal à  $v$ , donc  $l(v) \in \left(\left(\text{Vect}(v)\right)^\perp\right)^\perp = \text{Vect}(v)$ , donc  $v$  est un vecteur propre pour l'endomorphisme  $l$ .

**II.2.3.** On a  $\|x\| = 1$  et  $l(x) = \lambda x$ , donc  $\Phi(x) = (l(x)|x) = \lambda\|x\|^2 = \lambda$ , et  $\rho = \Phi(v)$  par le même calcul. Donc  $\lambda \leq \rho$  puisque  $\Phi(v) = \max_{u \in S} \Phi(u) \geq \Phi(x)$ .

**II.3.1** On a  $l(x) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j\right) e_i$ , puis  $\Phi(x) = (l(x)|x) = \sum_{i,j} a_{i,j} x_i x_j$ . Donc

$$|\Phi(x)| = \left| \sum_{i,j} a_{i,j} x_i x_j \right| \leq \sum_{i,j} a_{i,j} |x_i| |x_j| = \Phi(x^+).$$

**II.3.2.** Si  $x \in S$ , alors  $x^+ \in S$ , donc  $\Phi(x^+) \leq \max_{u \in S} \Phi(u) = \rho$ , mézôssi  $\Phi(x^+) \geq |\Phi(x)| = |\rho| \geq \rho$ .

Des inégalités  $\rho \leq |\rho| \leq \Phi(x^+) \leq \rho$ , on déduit que tous les membres de cette inégalité sont égaux, donc  $\rho = \Phi(x^+)$ , et  $\rho \geq 0$  puisque  $\rho = |\rho|$ .

**II.4.** Si  $x \in S$  vérifie  $l(x) = \lambda x$ , alors  $\Phi(x) = \lambda$ , donc  $|\lambda| = |\Phi(x)| \leq \Phi(x^+) \leq \max_{u \in S} \Phi(u) = \rho$ .

Donc  $|\lambda| \leq \rho$ , et  $\rho = \max_{\lambda \in \text{Sp}(l)} \lambda = \max_{\lambda \in \text{Sp}(l)} |\lambda|$ .

**II.5.** On a  $x^+ \in S$  et  $\Phi(x^+) \geq |\Phi(x)| = |\rho| = \rho = \max_{u \in S} \Phi(u)$ , donc  $\Phi(x^+) = \max_{u \in S} \Phi(u)$ , ce qui entraîne  $l(x^+) = \rho x^+$  d'après **II.2.2**.

Montrer  $x^+ > 0$  revient à prouver que  $x_i \neq 0$  pour tout  $i$ . Si ce n'était pas le cas, en posant  $I = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid x_i = 0\}$  et  $J = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid x_i \neq 0\}$ , on aurait une partition de l'ensemble  $\llbracket 1, n \rrbracket$  (c'est-à-dire  $I \neq \emptyset, J \neq \emptyset, I \cap J = \emptyset, I \cup J = \llbracket 1, n \rrbracket$ ) ; la relation

$$l(x^+) = \rho x^+ \text{ s'écrit } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \sum_{j=1}^n a_{i,j} |x_j| = \rho |x_i|. \text{ Pour tout indice } i \in I, \text{ on aurait}$$

donc  $\sum_{j=1}^n a_{i,j} |x_j| = \sum_{j \in J} a_{i,j} |x_j| = 0$  et chaque terme de la somme étant positif, on déduirait

$\forall j \in J \quad a_{i,j} = 0$  puisque  $|x_j| \neq 0$  ; on aurait donc une partition  $\{I, J\}$  de l'ensemble  $\llbracket 1, n \rrbracket$  telle que  $\forall (i, j) \in I \times J \quad a_{i,j} = 0$ , ce qui est contraire à l'hypothèse. Cela prouve  $x^+ > 0$ .

**II.6.** Le vecteur  $w = \frac{y}{\|y\|}$  est dans  $S$  et  $l(w) = \rho w$ , donc  $w^+ > 0$  d'après **II.5.**, ce qui signifie que les coordonnées du vecteur  $w$  sont toutes non nulles, en particulier  $w_1 \neq 0$ , donc  $y_1 \neq 0$ .

Si le vecteur  $z = x - \frac{x_1}{y_1} y$  est non nul, alors le vecteur  $u = \frac{z}{\|z\|}$  appartient à  $S$ , et il vérifie

$$l(u) = \rho u, \text{ donc } u^+ > 0, \text{ donc } u_1 \neq 0, \text{ donc } z_1 = x_1 - \frac{x_1}{y_1} y_1 \neq 0, \text{ ce qui est absurde. On}$$

a donc  $z = 0$ , ce qui signifie que  $x$  et  $y$  sont colinéaires. Deux vecteurs propres de  $l$  pour la valeur propre  $\rho$  sont toujours colinéaires, donc le sous-espace propre est de dimension au plus 1. Comme  $\text{Ker}(l - \rho \text{id}) \neq \{0\}$  d'après **II.2.2.**, ce sous-espace propre est donc de dimension 1.

*Remarque.* Cela montre au passage, avec **II.5.**, que ce sous-espace propre admet un vecteur directeur strictement positif.

**II.7.** De  $l(x) = \lambda x$ , on déduit, pour tout  $i$ ,  $\lambda = \frac{1}{x_i} \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \geq 0$ .

Si on avait  $\lambda \neq \rho$ , les sous-espaces propres de  $l$  pour les valeurs propres  $\lambda$  et  $\rho$  seraient orthogonaux (car  $l$  est autoadjoint), et si  $y > 0$  est un vecteur directeur de  $E_\rho(l)$ , on a

$$(x|y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = 0, \text{ ce qui est absurde, les } x_i \text{ et } y_i \text{ étant tous strictement positifs. Donc}$$

$$\lambda = \rho.$$

**II.8.** La matrice  $A$  est symétrique réelle, à coefficients positifs ou nuls et, s'il existait une partition  $\{I, J\}$  de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  telle que  $a_{i,j} = 0$  pour tout  $(i, j) \in I \times J$ , en choisissant un indice  $k$  appartenant à  $I$  (puisque  $I \neq \emptyset$ ), on aurait  $k+1 \in I$  puisque  $a_{k,k+1} = 1 \neq 0$ , puis  $k+2 \in I$  et ainsi de suite jusqu'à  $n \in I$ , puis  $1 \in I$  car  $a_{n,1} = 1 \neq 0$ , et ainsi de suite jusqu'à  $k-1 \in I$ , finalement  $I = \llbracket 1, n \rrbracket$ , ce qui est absurde : la matrice  $A$  vérifie donc les conditions (1) et (2) de l'énoncé.

Par ailleurs, le vecteur  $x = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  vérifie  $x > 0$  et  $Ax = 2x$ . De la question **II.7.**, on déduit

$$\text{que } \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda| = 2.$$