

ENS 2001 - PSI

Partie I

I.1) pas de pb. L'hypothèse de domination est bien vérifiée : $|g(x)\cos(tx)| \leq |g(x)|$, cette dernière fonction étant intégrable.

I.2) a) $F_g(t) = \operatorname{Re} \int_0^\infty e^{-x+itx} dx = \operatorname{Re} \frac{1}{1-it} = \frac{1}{1+t^2}$

b) pas de zéros réels

c) F_g est dans E.

I.3) a) $S_{a,A}(t) = a \int_0^A \cos(tx) dx = a \frac{\sin(tA)}{t}$

c) les zéros réels sont les $\frac{k\pi}{A}$, k entier non nul.

d) pas intégrable.

Partie II

II.1) Lemme de Riemann-Lebesgue. Le plus simple est de découper en intervalle où g est C^1 et d'intégrer par parties.

II.2) a) La fonction $x \rightarrow \frac{\sin(nx)}{x}$ est continue sur $[0,1]$ (et vaut n en 0).

b) Intégrer par parties : $u' = \sin(nx)$, $v = \frac{1}{x}$ en prenant $u = 1 - \cos(nx)$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \int_0^\infty \frac{1 - \cos(x)}{x^2} dx = l$ qui existe car $\frac{1 - \cos(x)}{x^2}$ est bien intégrable sur $[0, +\infty[$

(rem : MAPLE donne $\frac{\pi}{2}$ pour cette limite).

II.3) a) $\int_0^1 g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx = \int_0^1 \frac{g(x) - g(0^+)}{x} \sin(nx) dx + \int_0^1 g(0^+) \frac{\sin(nx)}{x} dx$

La première intégrale tend vers 0 (cf II.1) car $x \rightarrow \frac{g(x) - g(0^+)}{x}$ est C^1 par morceaux (y compris en 0, faire un développement limité). La seconde intégrale tend vers $g(0^+)l$.

b) Supposons $b > 0$. On a alors :

$$\int_0^b g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx = \int_0^1 g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx + \int_1^b g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx$$

avec la deuxième intégrale qui tend

vers 0 (cd II.1 avec la fonction $\frac{g(x)}{x}$). Donc la limite est $g(0^+)l$. Par contre, si $b < 0$, on trouvera

$-g(0^-)l$ (faire changement de variable $x \rightarrow -x$). Enfin, si $b = 0$, l'intégrale est nulle. Donc la limite demandée vaut :

0	si $a < b < 0$
$g(0^-)l$	si $a < b = 0$
$(g(0^-) + g(0^+))l$	si $a < 0 < b$
$g(0^+)l$	si $0 = a < b$
0	si $0 < a < b$

c) Prendre a négatif suffisamment grand en valeur absolue et b suffisamment grand pour que, ε étant donné, $\int_{-\infty}^a g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx$ et $\int_b^{\infty} g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx$ soient inférieurs à ε en valeurs absolues.

Pour cet a et ce b , il existe un rang N_0 tel que pour $n > N_0$, on ait :

$$\left| \int_a^b g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx - (g(0^-) + g(0^+))l \right| < \varepsilon$$

On aura alors $\left| \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx - (g(0^-) + g(0^+))l \right| < 3\varepsilon$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \frac{\sin(nx)}{x} dx = (g(0^-) + g(0^+))l$

II.4) On a déjà $\int_{-n}^n dt \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \cos(ty) dy = 2 \int_0^n dt \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \cos(ty) dy$

puisque la fonction $t \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \cos(ty) dy$ est paire. Considérons les fonctions :

$$X \rightarrow 2 \int_0^X dt \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \cos(ty) dy \text{ et } X \rightarrow 4 \int_0^X F_g(t) \cos(xt) dt$$

Ces deux fonctions sont nulles pour $X = 0$, continues, dérivables (car les fonctions que l'on intègre entre 0 et X sont des fonctions continues de t), de dérivées respectives :

$$2 \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \cos(Xy) dy \quad \text{et} \quad 4 F_g(X) \cos(xX)$$

La première expression vaut :

$$\begin{aligned} 2 \int_{-\infty}^{\infty} g(y) \cos(Xy - Xx) dy &= 2 \cos(xX) \int_{-\infty}^{\infty} g(y) \cos(Xy) dy + 2 \sin(xX) \int_{-\infty}^{\infty} g(y) \sin(Xy) dy \\ &= 4 \cos(xX) \int_0^{\infty} g(y) \cos(Xy) dy \text{ en utilisant la parité de } g \end{aligned}$$

$= 4 \cos(xX) F_g(X)$ ce qui est bien la dérivée de la deuxième fonction.

Les deux fonctions ayant même dérivées et étant égales en un point sont égales partout.

II.5) $2 \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \frac{\sin(Xy)}{y} dy$ est également une fonction de X , nulle pour $X = 0$, continue (l'écrire

sous la forme $2X \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \varphi(Xy) dy$ avec $\varphi(u) = \frac{\sin(u)}{u}$ continue et bornée. On a alors une

hypothèse de domination qui est vérifiée : $|g(x+y) \varphi(Xy)| \leq \text{Cte} \times |g(x+y)|$). Elle est également dérivable de dérivée $2 \int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \cos(Xy) dy$. Elle est donc égale aux fonctions du II.4). Ainsi, pour

$X = n$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x+y) \frac{\sin(ny)}{y} dy = 2 \int_0^n F_g(t) \cos(xt) dt$$

Quand on fait tendre n vers l'infini, le membre de gauche tend (d'après II.3.c) vers $(g(x^-) + g(x^+))l$ qui n'est autre que $2g(x)l$. D'où le résultat demandé.

II.6) non, cf I.2.c.

Partie III

III.1) a) Prendre A assez grand pour dépasser la valeur absolue des racines de F_g . F_g étant paire, le signe de F_g au delà de A et en deçà de $-A$ est le même, par exemple positif. F_g étant bornée par $\int_0^\infty |g(x)| dx$, prendre $a = \int_0^\infty |g(x)| dx + 1$.

b) Soit $K(t) = F_g(t) + h_{a,A}(t)$. On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n K(t) \cos(xt) dt = lg(x) + S_{a,A}(x)$$

Pour $x = 0$, on obtient le fait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n K(t) dt$ existe. K étant de signe constant, cela signifie que K est intégrable.

III.2) La fonction $x \rightarrow \int_0^\infty K(t) \cos(xt) dt$ est continue, de même que $S_{a,A}$ donc g devrait l'être aussi.

Ainsi g discontinue en un point au moins implique que F_g possède une infinité de zéros (cas du I.3)

III.3) Cette question montre que la condition ci-dessus n'est pas nécessaire. L'indication donnée dans l'énoncé est mystérieuse. On propose une autre solution. En vérifiant les hypothèses adéquates de domination, on voit que F_g est indéfiniment dérivable et que :

$$\begin{aligned} F_g^{(3)}(t) &= \int_0^\infty x^3 \exp(-x^4) \sin(xt) dx = \frac{t}{4} \int_0^\infty \exp(-x^4) \cos(xt) dx \text{ en intégrant par parties} \\ &= \frac{t}{4} F_g(t). \end{aligned}$$

En outre, F_g et ses dérivées tendent vers 0 quand t tend vers l'infini (généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue vu au II.1) que l'on peut montrer là aussi par une intégration par parties. Par

exemple : $F_g^{(3)}(t)$ est de la forme $\int_0^\infty h(x) \sin(xt) dx = \left[\frac{-h(x)\cos(xt)}{t} \right]_0^\infty + \int_0^\infty \frac{h'(x)\cos(xt)}{t} dx$ avec le

crochet qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini, et l'intégrale aussi car $\int_0^\infty h'(x)\cos(xt) dx$ reste

bornée lorsque h' est intégrable).

Supposons que F_g est de signe constant au delà d'un A , par exemple strictement positive. On a alors :

$F_g^{(3)}(t)$ strictement positive
 $\Rightarrow F_g^{(2)}(t)$ strictement croissante. Or $F_g^{(2)}(t)$ tend vers 0 en $+\infty$
donc $F_g^{(2)}(t)$ est strictement négative
 $\Rightarrow F_g'(t)$ est strictement décroissante. Or $F_g'(t)$ tend vers 0 en $+\infty$
donc $F_g'(t)$ est strictement positive
 $\Rightarrow F_g(t)$ est strictement croissante. Or $F_g(t)$ tend vers 0 en $+\infty$
donc $F_g(t)$ est strictement négative. Contradiction.